平成１６年度　生産履歴帳（メロン）

■病害虫防除

用　途		薬剤名	適切使用基準 処理濃度･量等使用 10a　時　期	使用 回数	記　録　欄 1回目 倍　率	2回目 倍　率	3回目 倍　率	4回目 倍　率	5回目 倍　率	6回目 倍　率	7回目 倍　率
殺虫剤	20	チェス水和剤	2000～3000倍　散布 収穫3日前	4	／	／	／	／	／	／	／
	21	ベストガード粒剤	1～2g/株 定植時	1	／	／	／	／	／	／	／
	22	マブリック水和剤20	4000倍　散布 収穫3日前	2	／	／	／	／	／	／	／
	23	アディオン乳剤	2000～3000倍　散布 収穫前日	5	／	／	／	／	／	／	／
	24	アファーム乳剤	1000～2000倍　散布 収穫前日	2	／	／	／	／	／	／	／
	25	コロマイト乳剤	1000倍　散布 収穫前日	2	／	／	／	／	／	／	／
	26	ピラニカEW	2000～3000倍　散布 収穫3日前	1	／	／	／	7月22日 ２０００倍	／	／	／
	27	ダニトロンフロアブル	1000～2000倍　散布 収穫前日	1	／	／	／	／	8月11日 １０００倍	／	／
	28	バロックフロアブル	2000倍　散布 収穫前日	2	／	／	／	／	／	／	／
	29	マイトコーネフロアブル	1000倍　散布 収穫前日	1	／	／	／	／	／	／	／
	30	ddvp50			／	／	7月12日 １０００倍	／	8月1日 １０００倍	8月11日 １０００倍	／
	31				／	／	／	／	／	／	／
	32				／	／	／	／	／	／	／
	33				／	／	／	／	／	／	／
	34				／	／	／	／	／	／	／
	35				／	／	／	／	／	／	／

■除草剤

用　途		薬剤名	適切使用基準 処理濃度･量等使用 10a　時　期	使用 回数	記　録　欄 1回目 薬　量	2回目 薬　量	3回目 薬　量	4回目 薬　量	5回目 薬　量	6回目 薬　量	7回目 薬　量
除草剤	36	トレファノサイド粒剤2.5	2～3kg 土壌処理･定植前、マルチ前、植穴掘前 生育期は畦間、収穫45日前	1	／	／	／	／	／	／	／
	37	トレファノサイド乳剤	150～200ml 土壌処理･定植前、マルチ前、植穴掘前 生育期は畦間、収穫45日前	1	／	／	／	／	／	／	／
	38	バスタ液剤	300～500ml 畦間雑草処理･定植後雑草発生初期～生育期 収穫30日前まで	1	／	／	／	／	／	／	／
	39				／	／	／	／	／	／	／
	40				／	／	／	／	／	／	／
	41				／	／	／	／	／	／	／
	42				／	／	／	／	／	／	／
	43				／	／	／	／	／	／	／