

平成17年度 生産履歴帳 (南瓜)

支所名 ニセコ

支所

生産者氏名 岩崎朝雄

組合員 コード

圃場番号

作物名 カボチャ

品種名 味平

播種毎の栽培管理内容

播種面積	5 0 a	
前作物	米・小麦・大豆・小豆・馬鈴薯 てん菜・野菜()	
栽植密度	畦幅 3 5 0 cm	株間 4 0 cm
マルチ使用有無	有	

施肥・土壌改良材等使用内容
堆肥使用状況

使用月日	銘柄名	10a当り 使用量	成分内容
5月 24 日	有機879 発酵鶏糞	各120 kg	N P K
6月 28日	有機879	30 kg	N P K

施肥・土壌改良剤状況(葉面散布剤含む)

使用月日	銘柄名	10a当り 使用量	成分内容
7月 9日	日ーヒB5 アクアカル	1000倍	N P K
7月 22日	日ーヒB5 アクアカル	1000倍	N P K
8月 1日	日ーヒB5 アクアカル	1000倍	N P K
月 日		kg	N P K
月 日		kg	N P K
月 日		kg	N P K
月 日		kg	N P K
月 日		kg	N P K
月 日		kg	N P K
月 日		kg	N P K

作業内容	作業月日
耕起日	5月 12日
整地日	5月 13日
播種日	4月 24日
定植日	5月 28日
	月 日
	月 日
	月 日
	月 日
	月 日
	月 日
収穫予定日	月 日

病害虫防除

用途	薬剤名	適切使用基準		記録欄						
		処理濃度・量等使用 10a 時期	使用回数	回数 月日	1回目 7月9日	2回目 7月22日	3回目 8月1日	4回目 8月2日	5回目	6回目 /
殺虫剤	1 マブリック水和剤20	4000倍 散布 収穫21日前	2	倍率or量 水量%						
	2 アディオン乳剤	2000倍 散布 収穫前日	5	倍率or量 水量%						
	3 エルサン乳剤	1000倍 散布 収穫3日前	3	倍率or量 水量%						
	4 DDVP			倍率or量 水量%	1000倍					
	5			倍率or量 水量%						
殺菌剤	6 ダイファー水和剤	400倍 散布 収穫30日前	3	倍率or量 水量%						
	7 ビスダイセン水和剤	800倍 散布 収穫30日前	3	倍率or量 水量%						
	8 アリエッティ水和剤	400倍 散布 収穫前日	3	倍率or量 水量%						
	9 トリフミン水和剤	3000倍 散布 収穫前日	5	倍率or量 水量%		3000倍				
	10 ポリベリン水和剤	2000倍 散布 収穫7日前	4	倍率or量 水量%			2000倍			
	11 モレストン水和剤	3000~4000倍 散布 収穫3日前	3	倍率or量 水量%				3000倍		
	12 ストロビーフロアブル	3000倍 散布 収穫前日	3	倍率or量 水量%						
	13 ジーファイン水和剤	1000倍 散布 収穫前日	6	倍率or量 水量%						
	14 サルバトーレME	3000倍 散布 収穫前日	3	倍率or量 水量%						
	15 ジマンダイセン	600倍 30日		倍率or量 水量%						
	16 らボルドー	500倍		倍率or量 水量%		500倍		500倍		

除草剤防除

用途	薬剤名	適切使用基準		記録欄			備考欄
		処理濃度・量等使用 10a 時期	使用回数	回数 月日	1回目 /	2回目 /	
除草剤	17 トレファノサイド粒剤2.5	2kg	2	倍率or量 水量%			
		土壌処理・定植前、マルチ前(雑草発生前)		水量%			
		4~5kg		倍率or量 水量%			
		中耕除草後畦間(雑草発生前、収穫45日前迄)		水量%			
18			倍率or量 水量%				

上記に記載のない薬剤を使用した場合は空欄に薬剤名など記入して下さい。(但し、南瓜に登録ある薬剤に限ります。)